

ABAMECTIN PRENTISS









Acaricida e inseticida com ação de contato e ingestão



O **Abamectin Prentiss** é um acaricida e inseticida com ação de contato e ingestão, eficaz no combate a diversos tipos de pragas. Indicado para as culturas de algodão, batata, citrus, maçã, morango, pepino, pimentão e tomate, o Abamectin Prentiss oferece qualidade e controle das pragas da sua lavoura.

ABAMECTIN PRENTISS

Acaricida e inseticida com ação de contato e ingestão

Culturas	Pragas		Doses	
	Nome comum	Nome científico	Produto comercial	Ingrediente ativo
 Algodão	Ácaro-branco	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	300-600 mL pc/ha	5,4-10,8 g ia/ha
	Curuquerê	<i>Alabama argillaces</i>	300-600 mL pc/ha	5,4-10,8 g ia/ha
 Batata	Mosca-minadora	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	100-125 mL pc/100 L água	1,8-2,5 g ia/100 L água
 Citrus	Ácaro-da-falsa ferrugem	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	20-30 mL pc/100 L água	0,36-0,54 g ia/100 L água
 Maçã	Ácaro-vermelho europeu	<i>Panonychus ulmi</i>	75-150 mL pc/100 L água	1,35-2,7 g ia/100 L água
 Morango	Ácaro-rajado	<i>Tetranychus urticae</i>	50-125 mL pc/100 L água	0,90-2,25 g ia/100 L água
 Pepino	Mosca-minadora	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	50-125 mL pc/100 L água	0,9-2,25 g ia/100 L água
 Pimentão	Ácaro-rajado	<i>Tetranychus urticae</i>	50-125 mL pc/100 L água	0,9-2,25 g ia/100 L água
 Tomate	Mosca-minadora	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	50-150 mL pc/100 L água	1,35-2,7 g ia/100 L água

Aplicação

Algodão	Iniciar o controle logo após a constatação dos primeiros sintomas da praga.
Batata	Iniciar o controle logo após a constatação das primeiras minas nas folhas. Realizar 3 aplicações com intervalos de 7-9 dias entre elas.
Citrus	Iniciar o controle na fase de desenvolvimento dos frutos. Realizar uma aplicação.
Maçã	Aplicar o produto na fase entre as quedas das pétalas e início da frutificação, logo após a retirada das colméias do pomar. Repetir a aplicação após 7 dias.
Morango	Aplicar o produto no início da infestação. Repetir a aplicação após 8 dias.
Pepino, Pimentão, Tomate	Aplicar o produto no início da infestação. Repetir a aplicação após 7 dias.

Destino final das embalagens e resíduos

Recomenda-se a utilização total do produto, utilizando-se o sistema de tripla lavagem da embalagem e aproveitando a calda na aplicação do produto. As embalagens deverão ser devolvidas aos postos/centrais de recebimento, conforme a legislação vigente.

ATENÇÃO



Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO

UM PRODUTO COM A QUALIDADE



Rodovia PR 423 • Km 24,5 • CEP 81603-000
 Campo Largo – Paraná – Brasil
 Tel/FAX 55 41 3292 7115
0800 643 8053